

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE HEMIJE

- Nakon izvršene analize *pH* vrednosti u bazenu vrši se redukcija te vrednosti na 7,2-7,8. Najčešće se usled uobičajene upotrebe bazena podiže vrednost *pH*, što znači da je potrebno smanjiti je. Potrebno je vršiti proveru *Ph* vrednosti na svaka 3-4 dana.
- Nakon redukovane *pH* vrednosti može se raditi šok hlor tretman. Ukoliko bi se to radilo pre redukcije *pH* vrednosti voda bi poprimila braonkastu boju usled reakcije hlora na povišenu *pH* vrednost. Šok hlor tretman se radi jednom mesečno, a doziranje se vrši prema tabeli.
- Posle primene šok hlor tretmana ne dozirati nikakvu hemiju u bazen narednih 12 sati.
- Multi action tablete dozirati na svakih 5-7 dana prema tabeli.
- Na svakih 7 dana dozirati *Algicid* za sprečavanje pojavljivanja algi. Dozirati prema tabeli.
- Pre usisavanja bazena dozirati flokulant i pustiti da filter izmeša vodu. Prljavština sa zidova i poda se odvoji i filter je usisa koliko može. Deo koji ne može da pokupi filter se nagomila na podu pa se može usisati. Doziranje je 10 ml/m³ vode ukoliko se dozira neposredno pre usisavanja, odnosno 0,5ml po m³ protoka vode kroz pumpu.

Preporučeno doziranje hemije			
Zapremina bazena	Šok hlor	Multi tablete 200gr	Algicid
10 m ³	150 gr	½ tablete	0,1 litra
20 m ³	300 gr	1 tableta	0,2 litra
40 m ³	600 gr	1 ½ tablete	0,4 litra
60 m ³	900 gr	2 tablete	0,6 litra
80 m ³	1200 gr	2 ½ tablete	0,8 litra
100 m ³	1500 gr	3 tablete	1 litar
120 m ³	1800 gr	4 tablete	1,2 litra
Učestalost tretmana	Mesečno	Nedeljno (5-7 dana)	Nedeljno (5-7 dana)